



## オミクロン株対応ワクチンの接種をご検討ください

令和4年9月に薬事承認された「オミクロン株対応ワクチン」の接種が開始されています。

### 1. オミクロン株対応ワクチンと接種回数

このワクチンは従来型とオミクロン株の両方に対応した2価ワクチンで、1人1回接種できます。

使用ワクチン	接種対象年齢
ファイザー社製ワクチン	12歳以上
モデルナ社製ワクチン	18歳以上



### 2. 接種間隔…前回の接種から少なくとも3ヶ月以上経過後

オミクロン株対応ワクチン接種は5回目に行う接種とは限りません。これまでにワクチンを接種した回数に続けて数えますので、一人ひとり接種回数が異なります。なお、初回接種(1・2回目)が完了していない方は接種することができません。

1回目まで接種済みの方	2回目に従来型ワクチンを接種後、3回目にオミクロン株対応ワクチン
2回目まで接種済みの方	3回目がオミクロン株対応ワクチン
3回目まで接種済みの方	4回目がオミクロン株対応ワクチン
4回目まで接種済みの方	5回目がオミクロン株対応ワクチン



### 3. オミクロン株対応ワクチンの効果

このワクチンは、従来型に加えオミクロン株の成分が含まれ、オミクロン株に対して従来型ワクチンを上回る重症予防効果とともに、短い期間ではあるものの、感染予防効果、発症予防効果が期待されています。2種類の抗原があることで多様な新型コロナウイルスに対応可能とも考えられており、今後の変異株に対しても有効である可能性が高いことが期待されています。

### 4. ワクチンの安全性

ファイザー社製とモデルナ社製の2価ワクチンは、薬事承認においてどちらのワクチンも従来型ワクチンとおおむね同様の症状が見られています。

発現割合	接種後7日間に現れた症状	
	ファイザー社	モデルナ社
50%以上	注射部位疼痛	注射部位疼痛、疲労
10~50%	疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛	頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、悪心・嘔吐
1~10%	下痢、発赤、腫脹、発熱、嘔吐	紅斑・発赤、腫脹・硬結、発熱

### 初回接種(1・2回目接種)をしていない方でオミクロン株対応ワクチンの接種を希望する方へ

初回接種が完了していない方でワクチン接種を希望する方は、年内に接種を完了することをご検討ください。

※オミクロン株対応ワクチンは、初回接種が完了していないと接種できません。

### 接種券(予診票・接種済証)は未使用のものをお使いください

接種券(予診票、接種済証)は、2回目または3回目の接種から5ヶ月が経過する前に郵送します。未使用の接種券をお持ちの方は、そのまま接種券を使うことができます。

転入により接種券の発行が必要な方は、接種履歴のわかるもの(接種済証、接種記録書など)と本人確認書類をお持ちの上、健康こども課(健康づくりセンター「プラム」内)で発行手続きをお願いします。